

Colonoscopy con Instrucciones SUPREP

todo de la cita

Su intestino debe ser vacío de modo que el médico pueda ver claramente su colon. Por favor siga las instrucciones en este folleto. Si tiene alguna pregunta o es incapaz de guardar su , por favor póngase en contacto con la oficina.

los SUPREP Preparación del Intestino (Prescripción envían a la farmacia) Medicación Necesitará:

Importante: los

- no comen ningún el E NTIRE día antes de su colonoscopy.
- no mezclan la solución hasta el día antes de que su COMIDA SÓLIDA
- colonoscopy responsable (miembro de familia o amigo) DEBIERA venir con usted a su procedimiento y PERMANECER en el área de la endoscopia hasta que sea descargado. No es ALLO WED para conducir, tomar un taxi o autobús, o dejar el Centro de la Endoscopia en paz. Su examen no puede ser hecho con la sedación si no cumple con esto.

: los

Algunas medicaciones que toma tendrían que ser paradas o ajustadas antes de su colonoscopy. Usted que el m ust llama el doctor que pidió cualquiera de la medicación siguiente al menos 2 semanas antes de sus Medicaciones

colonoscopy y los informan de su colonoscopy previsto: los

Sangre thinners: tal como hidrocloreuro de

- Coumadin (warfarin), aspirina de Plavix (clopidogrel), Ticlid (ticlopidine), Agrylin (anagrelide), Advil/Motrin (ibuprofen) y Xarelto
- Insulina o píldoras de la diabetes: Su dosis de la insulina tendría que ser ajustada debido a restricciones de la dieta durante la preparación del intestino.

Toman todas otras medicaciones como instruido por su doctor, hasta durante el día de su colonoscopy (con un sorbo del agua). Los

el Conde Down a Colonoscopy

Cinco (5) Días antes de Que Sus Colonoscopy ...

- no toman medicinas que paran la diarrea (Imodium, Kaopectate o Pepto Bismol)
- no tomen suplementos de la fibra (Metamucil, Citrucel o Perdiem) no
- toman productos que contienen el hierro – mucho ya que las
- multivitaminas no toman la vitamina E

Compan la solución de preparación del intestino de la prescripción en su farmacia/farmacia de la ubicación

Tres (3) Días Antes de Su Colonoscopy ...

- no come alto - alimentos de la fibra, como palomitas de maíz, alubias, semillas (lino, girasol, quinoa), pan del multigrano, nueces, ensalada/verduras, o fruta fresca y frutas secas. Los

Un (1) Día Antes de Su Colonoscopy ... Ø

Solo beben líquidos claros el **DÍA ENTERO** antes de su colonoscopy. Bebida de no comen ningún al menos 8 onzas de líquidos claros cada hora después de despertamiento. Los líquidos claros que puede beber incluyen:

- Water, manzana o jugo de uva blanco; caldo
- ü Los Coffee o té (sin la leche o leche en polvo)
- ü Clear bebidas carbónicas como gaseosa de jengibre o limón - abonan
- ü Gatorade sode u otras bebidas de deportes (no rojo o azul)
- ü Kool - Ayuda u otras bebidas condimentadas (no rojo o azul)
- ü Llanura Jello u otras gelatinas (no rojo o azul) los polos (no rojo o azul)
- ü no beben un lcohol durante el día antes o el día del procedimiento

que Mezcla Su Preparación del Intestino

El cartón SUPREP contiene botellas y un contenedor disponible para la mezcla. Siga las instrucciones que se mezclan del cartón. Mezcle la solución SUPREP apenas que 24 horas ser usado. No añada hielo, azúcar o condimentos a la solución. No tome más que la dosis recomendada o los efectos secundarios serios podrían ocurrir. Puede refrigerar la preparación antes de la bebida.

Su doctor h como medicado la preparación del intestino en una manera de la dosis de separación. La bebida de la Preparación del Intestino

el Paso 1: Principio bebiendo SUPREP a las 18:00 la tarde antes de su colonoscopy. Beba los 16 - el contenedor de la onz. de la preparación del intestino. Beba **todo** el líquido en el contenedor. El

Usted **debe** beben más dos (2) 16 - contenedores de la onz. del agua durante la 1 hora siguiente.

Su puede seguir bebiendo líquidos claros hasta la hora de acostarse. Los

la próxima mañana, 5 horas antes de tiempo del examen, d pista de patinaje los 16 - contenedor de la onz. de preparación del intestino. **el Paso 2:** el líquido en el contenedor. Los Bebida **todo**

Usted **debe** beben tw o (más 2) 16 - contenedores de la onz. del agua durante la 1 hora siguiente. El

no comen o beben ALGO 4 horas antes de su colonoscopy



□ los

no COMEN O BEBEN ALGO MÁS **

esto incluye cualquier sorbo

del agua o líquido. Esto incluye la goma o el caramelo en la ubicación para su (Puede cepillar sus dientes.)

□

Registro

procedimiento

□

Si toma la medicación para la tensión arterial,

usted lo puede tomar 2 horas

antes del procedimiento con un sorbo del agua.

LA DIETA LÍQUIDA RESTRINGIDA INCLUYE: (¡NINGÚN ROJO o MORADO POR FAVOR!)

– Estirado, pulpa zumos de fruta libres (manzana, uva blanca, limonada) –
Café o té (ninguna leche o leche en polvo)

–Water

– Gatorade

– Carbonated/non-carbonated refrescos

– polos

– Kool-ayuda u otra fruta bebidas condimentadas

– caldo Claro o caldo

– Jalea-O Clara (ningunos toppings añadidos de la fruta)

–NO productos lácteos o alcohol